

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคตาฉุกเฉินเร่งด่วน

นอกเวลาราชการ

กรณีที่ควรส่งต่อผู้ป่วย (Urgent Cases)

การบาดเจ็บที่ดวงตา
(Ocular Trauma)

การอักเสบติดเชื้อรุนแรง
(Severe Infections)

การสัมผัสสารเคมีรุนแรง
(Chemical Injury)

ภาวะความดันในตาสูง
เฉียบพลัน (Acute Angle-Closure Glaucoma)

ปัญหาของประสาทตาและเส้นประสาท
ตา (Retinal/Optic Nerve Issues)

การประเมินเบื้องต้น

- วัดสายตา (Visual Acuity): ระบุระดับการมองเห็น
- ตรวจดูดวงตาเมื่อตื้น
- ประเมินนาฬิกา, การบวน, การมีสิ่งแผลกปลอม
- ตรวจด้วยไฟฉาย (Penlight) เพื่อ看出ม่านตาและอาการตาแดง
- วัดความดันตา (Intraocular Pressure): หากเครื่องมือพร้อมใช้งาน
- ซักประวัติ: เทเลและสถานที่ที่เริ่มเกิดอาการ

การคุ้มครองและจัดการเบื้องต้น

- กรณีบาดเจ็บ: ห้ามกดดวงตาหรือสัมผัสบริเวณด้วยแผ่นปาร์ปิดตา (Sterile Shield)
- กรณีการติดเชื้อ: ล้างตาด้วยน้ำเกลือปาร์ปิดจากเชื้อหรือน้ำสะอาดหันที่ 15-20 นาที
- กรณีความดันตาสูง: ให้ยาขยาย瞳孔ลดความดันเบื้องต้น (เช่น Timolol, Pilocarpine) หากมี
- กรณีติดเชื้อ: ให้ยาปฏิชีวนะมีดอนฟลูโซไซด์ (เช่น Ofloxacin) หรือยาปฏิชีวนะชนิดอีดีรับประทาน

การประสานงานการส่งต่อ

- แจ้งอาการผู้ป่วย, การรักษาเบื้องต้น และความเร่งด่วน
- จัดทำใบสั่งด้วยพัฒนาการ, การรักษาเบื้องต้น และประวัติทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประจ่าตัว (ยา/การรักษา)