

การดูแลส่งต่อผู้ป่วยทารกแรกเกิด

Fast tract system

1. Persistent pulmonary hypertension in newborn (PPHN)
 - Need $\text{FiO}_2 \geq 0.4$ to maintain Pre ductal saturation $\geq 95\%$
 - Labile oxygenation
 - Pre-post ductal SpO_2 difference $\geq 5\%$
2. Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE)
 - ทารกแรกเกิดอายุครรภ์ ≥ 35 สัปดาห์ และน้ำหนักแรกเกิด ≥ 2000 กรัม
 - มีประวัติดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
 - มีประวัติเสี่ยงขณะคลอด เช่น fetal distress, prolapsed cord, abruptio placenta, eclampsia, shoulder dystocia
 - ร่วมกับ 1.) Apgar score ที่ 10 นาที ≤ 5
 - 2.) ต้องได้รับการช่วยหายใจมากกว่า 10 นาที
 - มีอาการ/อาการแสดงของ moderate หรือ severe encephalopathy อย่างน้อย 1 ข้อ
 - 1.) ซึม
 - 2.) ตัวอ่อน/ความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง (hypotonia)
 - 3.) มีอาการลดลงของ primitive reflex
 - ผล blood gas ที่อายุไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือ cord blood gas พบ pH ≤ 7.2 หรือ base deficit ≥ -12

Other condition

1. Need mechanical ventilator
2. Surgical condition
3. เกินศักยภาพ (Multidisciplinary team care)

****ติดต่อศูนย์รีเฟอร์ รพ.ชลบุรี Line ID: refercbh2013 หรือผ่าน Line ID: Service plan NB CBH****